

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

КАЛЕНДУЛЫ НАСТОЙКА

**Регистрационный номер:** ЛСР-010529/09

**Торговое название:** Календулы настойка

**Группировочное наименование:** Календулы лекарственной цветков настойка

**Лекарственная форма:** настойка

**Состав на 1000 мл:**

*Активный компонент:*

Ноготков лекарственных цветки - 100 г

*Вспомогательное вещество:*

Этанол (этиловый спирт) 70 %- до 1000 мл

**Описание:** прозрачная жидкость желтовато-коричневого цвета с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа**

Антисептическое и противовоспалительное средство растительного происхождения.

**Фармакологическое действие**

Настойка календулы оказывает антисептическое, желчегонное, спазмолитическое и местное противовоспалительное действие.

**Показания к применению**

Применяют наружно как антисептическое и противовоспалительное средство при порезах, ушибах, экземах; местно - для полоскания горла при воспалительных заболеваниях глотки (тонзиллит, фарингит, ларингит) и слизистой оболочки полости рта (стоматит, гингивит, пародонтит).

Внутрь настойку календулы применяют при холецистите, холангите.

**Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

При применении внутрь – острый гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, калькулезный холецистит, беременность, период лактации, возраст до 18 лет.

**С осторожностью** – заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

**Способ применения и дозы**

Наружно, местно, внутрь. Участки с поверхностными повреждениями кожных покровов (порезы) обрабатывают настойкой с помощью тампона. При ушибах и экземе применяют водный раствор настойки (1 чайную ложку на стакан воды) в виде примочек. Для полоскания горла и слизистой оболочки полости рта используют ½-1 стакан водного раствора настойки.

Внутрь применяют по 10-20 капель, разведенных в  $\frac{1}{4}$  стакана воды перед едой 3 раза в день.

**Побочное действие**

Возможны аллергические реакции (в т. ч. кожный зуд). При приеме внутрь – изжога, тошнота, горечь во рту, усиление болей в животе.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

В настоящее время не изучено.

**Особые указания**

Содержание абсолютного спирта в максимальной разовой дозе препарата составляет 0,23 г, в максимальной суточной дозе - 0,7 г.

В период лечения (при приеме внутрь) необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Форма выпуска.** Настойка

По 10, 15, 20, 25 мл во флаконы-капельницы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полизиленовыми или пробками-капельницами полизиленовыми и навинчиваемыми пластмассовыми крышками.

По 10, 15, 20, 25 мл во флаконы темного стекла, укупоренные пробками полизиленовыми или пробками-капельницами или пробками и навинчиваемыми пластмассовыми крышками.

Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается упаковка флаконов, флаконов-капельниц без пачки от 9 до 200 штук с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку - ящик из гофрированного картона (для стационаров).

По 9, 18 кг в бутыли стеклянные, укупоренные пробками притертymi или крышками навинчиваемыми с прокладками (для стационаров).

Каждую бутыль по 9; 18 кг с инструкцией по применению помещают в ящик из гофрированного картона (для стационаров).

**Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.

Не использовать после истечения срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта (для флаконов, флаконов капельниц).

Для лечебно-профилактических учреждений (для флаконов, флаконов капельниц и бутылей стеклянных по 9 и 18 кг).

**Производитель/Организация, принимающая претензии:**

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

300004, г. Тула, Торховский проезд, дом 10

Тел/факс: 8 (4872) 41-04-73