

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ОКСОЛИН

Номер регистрационного удостоверения: ЛП-003430

Торговое наименование Оксолин

Группировочное наименование Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин

Лекарственная форма:

Мазь для наружного применения

Состав.

Действующее вещество: диоксотетрагидрокситетрагидронафталин (оксолин) – 3,0 г

Вспомогательные вещества: парафин жидкий (вазелиновое масло) – 6,0 г, вазелин – до 100 г.

Описание Мазь от белого до светло-желтого цвета. При хранении допускается появление розового оттенка.

Фармакотерапевтическая группа Противовирусное средство для местного применения

Код АТХ: D06BB.

Фармакологическое действие

Фармакодинамика

Противовирусное средство для наружного применения.

Обладает противовирусной активностью, блокируя места связывания вируса с поверхностью клеточной мембраны, препятствует репродукции вируса в клетках. К действию диоксотетрагидрокситетрагидронафталина чувствительны вирусы Herpes simplex, опоясывающего герпеса, аденовирусы, вирусы инфекционных бородавок и контактного моллюска.

Фармакокинетика

При нанесении на кожу всасывается около 5 % препарата. В организме не кумулирует и выводится в основном почками в течение суток.

Показания к применению

Лечение бородавок (обыкновенных, плоских и остроконечных кондилом).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью

Беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 2-х лет.

Способ применения и дозы Наружно.

Лечение бородавок (обыкновенных, плоских и остроконечных кондилом): смазывают их поверхность 2-3 раза в день в течение от 2 недель до 2 месяцев. Для усиления эффекта после нанесения мази накладывают окклюзионную повязку с вощеной бумагой.

Побочное действие

Ощущение жжения, дерматит, легко смываемое синее окрашивание.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Не изучалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Особые указания

Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Влияние на способности управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (работа диспетчера, управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 3 %.

По 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 г в банки оранжевого стекла с треугольным венчиком с крышкой натягиваемой с уплотняющим элементом.

По 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 г в банки полимерные из полиэтилена низкого давления или высокого давления в комплекте с крышками или в банки со средствами укупорочными из полиэтилен-терфталата.

По 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 г в тубы алюминиевые покрытые лаком БФ-2, с колпачками из полиэтилена высокого давления.

Каждую банку и тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается упаковка банок или туб без пачки от 9 до 300 штук с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку ящик из гофрированного картона (для стационаров).

Условия хранения

При температуре от 5 до 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73