

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
ЙОВИДОКС

**Регистрационный номер:** ЛП-007427

**Торговое наименование** ЙОВИДОКС

**Международное непатентованное или группировочное наименование** повидон-йод

**Лекарственная форма** Мазь для наружного применения

**Состав на 100 г**

*Действующее вещество:* повидон-йод – 10,000 г, что соответствует активному йоду – 1,025 г.

*Вспомогательные вещества:* натрия гидрокарбонат - 0,335 г, макрогол 400 - 41,465 г, макрогол 4000 - 20,250 г, макрогол 1000 - 10,760 г, макрогол 1500 - 7,190 г, вода очищенная - до 100,000 г.

**Описание**

Однородная мазь коричневого цвета со слабым запахом йода.

**Фармакотерапевтическая группа**

Антисептическое средство.

**Код АТХ:** D08AG02

**Фармакологические свойства**

Антисептическое и дезинфицирующее средство. Высвобождаясь из комплекса с поливинилпирролидоном при контакте с кожей и слизистыми, йод образует с белками клетки бактерий йодамины, коагулирует их и вызывает гибель микроорганизмов. Оказывает быстрое бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии (за исключением *M. tuberculosis*). Эффективен в отношении грибов, вирусов, простейших.

**Фармакокинетика**

При наружном применении почти не происходит реабсорбции йода.

**Показания к применению**

Посттравматические и послеоперационные раны различной локализации, ожоги, трофические язвы, пролежни. Инфекции кожи различной этиологии, в том числе инфекционные дерматиты и экземы. Повреждение кожных покровов различного происхождения (ссадины, ушибы).

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к йоду, компонентам препарата, период грудного вскармливания, период новорожденности, гипертиреоз или другие выраженные нарушения функции щитовидной железы, аденома щитовидной железы, тиреотоксикоз, герпетиформный дерматит Дюринга, одновременное применение радиоактивного йода, состояние до и после применения радиоактивного йода для лечения гипертиреоза (до полного выздоровления). Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед применением препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

**С осторожностью:** беременность и период грудного вскармливания, хроническая почечная недостаточность, пожилой возраст.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Недостаточно данных о применении препарата у беременных и в период грудного вскармливания, если Вы беременны, или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение ЙОВИДОКС не рекомендуется с 3-го месяца беременности и во время периода грудного вскармливания. При необходимости в этих случаях лечение возможно под индивидуальным медицинским контролем.

**Способ применения и дозы** Наружно, на пораженную поверхность мазь наносят тонким слоем, 2-3 раза в сутки, можно использовать под окклюзионные повязки.

Кратность нанесения и продолжительность применения препарата зависят от локализации и тяжести поражения кожи. Курс лечения, как правило, составляет 5-10 дней. Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

**Побочное действие**

При применении препарата возможны нежелательные реакции: гиперемия, жжение, зуд, отек, боль. В редких случаях повидон-йод может вызывать реакции гиперчувствительности, например, контактный дерматит. При возникновении таких явлений применение препарата следует прекратить. Очень редко возможны анафилактические реакции вплоть до анафилактического шока. Длительное применение, нанесение на обширные участки кожи, использование окклюзионных повязок может приводить к абсорбции значительного количества йода. В некоторых случаях описано развитие вызванного йодом гипертиреоза, преимущественно у больных с ранее имевшимся заболеванием щитовидной железы. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщить об этом врачу.

**Передозировка**

При случайном проглатывании препарата возможно появление следующих симптомов: анурия, коллапс, отек гортани, отек легких. Необходимо провести промывание желудка, для устранения симптомов передозировки проводят симптоматическую терапию. При длительном применении препарата, при нанесении на обширные поверхности возможна абсорбция йода и появление симптомов гипертиреоза, таких как, тахикардия, возбужденное состояние, дрожь, головная боль. Легкие формы гипертиреоза не требуют вмешательства, тяжелые формы могут потребовать тиреостатической терапии.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Совместное применение препарата с пероксидом водорода, ферментными препаратами, содержащими серебро и тауролидин, а также антисептических препаратов, приводит к взаимному снижению эффективности. Несовместим с другими дезинфицирующими и антисептическими средствами, средствами, содержащими щелочи. В присутствии крови бактерицидное действие может уменьшаться, однако при увеличении концентрации, бактерицидная активность может быть увеличена. Повидон-йод нельзя применять в сочетании с препаратами ртути. Препарат может вступать в реакцию с белками и ненасыщенными органическими комплексами. Следует избегать длительного применения препарата, особенно на больших поверхностях, у пациентов, получающих препараты лития. Повидон-йод несовместим с восстанавливающими веществами, солями алкалоидов, дубильной кислотой, салициловой кислотой, солями ртути, висмута. Если Вы применяете вышеперечисленные средства или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

**Особые указания**

При нарушениях функции щитовидной железы применение препарата возможно только под строгим наблюдением врача. Следует соблюдать осторожность при регулярном применении на поврежденной коже у пациентов с хронической почечной недостаточностью. Следует избегать попадания препарата в глаза. При применении препарата у детей необходимо использовать минимальные эффективные дозы, непродолжительное время. У недоношенных новорожденных детей применение препарата противопоказано. Не следует применять чрезмерное количество препарата, следить за тем, чтобы в складках, ранах не оставались излишки препарата. В присутствии крови бактерицидное действие повидон-йода может снижаться. При применении препарата возможно окрашивание кожи и одежды.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Форма выпуска** Мазь для наружного применения 10 %.

По 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 г в тубы алюминиевые, укупоренные бушоном из полиэтилена.

По 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100 г в тубы из комбинированного материала, укупоренные бушоном из полиэтилена. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

**Условия хранения** При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности** 3 года. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска** Отпускают без рецепта.

**Производитель/Организация, принимающая претензии:**

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10 Тел./факс: (4872) 41-04-73