

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ЖЕНЬШЕНЯ НАСТОЙКА

**Регистрационный номер:** ЛП-001707

**Торговое наименование:** Женьшена настойка

**Лекарственная форма:** настойка

**Состав.**

**Для приготовления 1000 мл настойки необходимо:**

*Активное вещество:*

Женьшена корни – 100 г

*Вспомогательное вещество:*

Этанол (спирт этиловый) 70 % – достаточное количество до получения 1000 мл препарата.

**Описание:** прозрачная жидкость от желтоватого до желтого цвета с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** общетонизирующее средство растительного происхождения.

**Код ATX [A13A]**

**Фармакологические свойства**

Стимулирует центральную нервную систему, оказывает общетонизирующее, гипертензивное и гипогликемическое действие; улучшает аппетит, повышает артериальное давление, умственную и физическую работоспособность, стимулирует половую функцию; уменьшает общую слабость, повышенную утомляемость, сонливость; снижает содержание холестерина и сахара в крови, активирует деятельность коры надпочечников.

Фармакологическая активность обусловлена содержанием тритерпеновых гликозидов (панаксозиды, панаквилон, панаксин), эфирных и жирных масел, пектиновых веществ, витаминов, микро- и макроэлементов, а также фитоэстрогенов и даукостерина.

**Показания к применению**

Артериальная гипотензия (пониженное артериальное давление), астенический синдром, физическое и психическое переутомление, неврастенический синдром, период реконвалесценции после перенесенных длительных и тяжелых, в том числе инфекционных заболеваний, нейроциркуляторная дистония по гиптоническому типу, в комплексной терапии при ослаблении половой функции на почве неврастении.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление), повышенная возбудимость, эпилепсия, судорожные состояния, расстройства сна, острые инфекционные заболевания, кровоточивость, хронические заболевания печени, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

**С осторожностью:** алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, заболевания печени.

**Способ применения и дозы**

Внутрь за 30-40 минут до еды по 15-25 капель 2-3 раза в день. Курс лечения 30-40 дней. Целесообразность проведения повторного курса определяется врачом.

**Побочное действие**

Аллергические реакции, тахикардия, головная боль, нарушения сна, повышение артериального давления, гипогликемия.

**Передозировка**

При превышении рекомендуемых доз возможно усиление побочных эффектов, носовое кровотечение. Лечение симптоматическое.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Усиливает действие психостимуляторов и аналгетиков (в т.ч. кофеина, камфоры и др.). Проявляет антагонизм при взаимодействии с лекарственными средствами, угнетающими центральную нервную систему (противоэpileптические препараты, нейролептики, транквилизаторы и седативные средства). Усиливает действие гипогликемических лекарственных средств. Усиливает действие варфарина. Повышает риск развития резистентности к петлевым диуретикам.

**Особые указания**

Препарат не следует применять во второй половине дня во избежание нарушения сна.

Имеется четко выраженная сезонность действия: применение осенью и зимой наиболее эффективно.

Содержание абсолютного спирта в максимальной разовой дозе препарата – 0,23 г, в максимальной суточной дозе – 0,7 г.

При применении препарата следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

**Форма выпуска**

Настойка.

По 25 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные полиэтиленовыми пробками и крышками навинчиваемыми пластмассовыми.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель/Организация, принимающая претензии:**

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д.10

Тел./факс: (4872) 41-04-73