

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
Солодки сироп

**Номер регистрационного удостоверения:** ЛП-002133

**Торговое наименование:** Солодки сироп

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** солодки корней экстракт

**Лекарственная форма:** сироп

**Состав на 100 г.**

*Действующее вещество:*

Солодки корней экстракт густой - 4 г

*Вспомогательные вещества:*

Сахароза (сахар) - 55,04 г

Этанол (этиловый спирт) 95 % - 9,27 г

Вода очищенная - 31,69 г

**Описание:** густая жидкость коричневого цвета со своеобразным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** отхаркивающее средство растительного происхождения.

**Код АТХ:** [R05CA]

**Фармакологическое действие**

Препарат оказывает отхаркивающее действие, обусловленное, в первую очередь, наличием глицирризина, усиливающего секреторную функцию слизистых оболочек верхних дыхательных путей.

**Показания к применению**

Применяют у взрослых и детей в качестве отхаркивающего средства при заболеваниях верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, главным образом, при наличии плохо отделяемого, густого и вязкого секрета (особенно у детей и лиц пожилого возраста).

**Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, бронхиальная астма, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

**С осторожностью**

Заболевания печени, алкоголизм, черепно - мозговая травма, заболевания головного мозга, сахарный диабет, детский возраст.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение лекарственного препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

**Способ применения и дозы**

Внутрь. Перед применением сироп следует взболтать!

Взрослым и детям старше 12 лет – по 1 чайной ложке, предварительно разведенной в 1/2 стакана воды, 3 раза в день.

Детям до 2 лет – по 1-2 капли (предварительно разведенных в 1 чайной ложке воды) 3 раза в день.

Детям с 2 до 6 лет – по 2-10 капель (предварительно разведенных в 1 чайной ложке воды) 3 раза в день.

Детям с 6 до 12 лет – по 50 капель (предварительно разведенных в 1/2 стакана воды) 3 раза в день.

Курс лечения 7-10 дней. Целесообразность проведения повторного курса лечения определяется врачом.

При наличии плохо отделяемой мокроты и для облегчения отхаркивания рекомендуется обильное теплое питье.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

**Побочное действие**

Возможны аллергические реакции; в отдельных случаях могут наблюдаться диспепсические явления (диарея). При длительном применении возможны гипокалиемия, повышение артериального давления, появление периферических отеков вследствие нарушения водно-электролитного обмена.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**Передозировка** При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. Лечение симптоматическое.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Препарат можно назначать одновременно с другими препаратами, применяемыми при лечении бронхолегочных заболеваний.

Не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением Солодки сиропа проконсультируйтесь с врачом.

**Особые указания**

Информация для пациентов с сахарным диабетом: в одной ложке препарата содержится 0,29 хлебных единиц (ХЕ), в 1 капле – 0,0024 ХЕ. Максимальная разовая доза препарата для взрослых содержит 0,54 г абсолютного спирта, максимальная суточная доза – 1,62 г абсолютного спирта, в 1 капле (для детей) – 0,0046 г абсолютного спирта.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Форма выпуска** Сироп

По 50, 100 г во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полимерными и крышками полимерными навинчиваемыми.

По 100 г во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные колпачками алюминиевыми.

По 50, 100 г во флаконы из полиэтилентерефталата, укупоренные колпачками полимерными винтовыми.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается упаковка флаконов с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку (для стационаров).

**Условия хранения** В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности** 2 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска** Отпускают без рецепта.

**Производитель/Организация, принимающая претензии:** ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10 Тел./факс: (4872)41-04-73