

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Метилурацил

Регистрационное удостоверение ЛП-004884

Торговое наименование

Метилурацил

Группировочное наименование

Диоксометилтетрагидропиримидин

Химическое название

6-Метилпиримидин-2,4(1Н,3Н)-дион

Лекарственная форма

Суппозитории ректальные

Состав на 1 суппозиторий:

Действующее вещество: Диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) – 0,5 г

Вспомогательные вещества: жир твердый (витепсол (марки Н 15, В 35), суппосир (марки НА 15, НАС 50)) – до получения суппозитория массой 2,3 г.

Описание

Суппозитории белого или белого с желтоватым или кремоватым оттенком цвета, торпедообразной формы. Допускается появление белого налета на поверхности суппозитория. На продольном разрезе – однородные, без вкраплений, допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

Фармакотерапевтическая группа

Репарации тканей стимулятор.

Код ATX: L03AX.

Фармакологическое действие

Обладает анаболической активностью. Оказывает гемопоэтическое, лейкопоэтическое, иммуностимулирующее, противовоспалительное действие. Нормализуя нуклеиновый обмен, ускоряет процессы клеточной регенерации в ранах, ускоряя рост и грануляционное созревание ткани и эпителизацию (в т.ч. в быстропролиферирующих клетках слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта), стимулирует эритро- и лейкопоэз, клеточные и гуморальные факторы иммунитета.

Показания к применению

Эрозивно-язвенные колиты, проктосигмоидиты, трещины заднего прохода.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, лейкоз (лейкемические формы), лимфогрануломатоз, гемобластозы, злокачественные заболевания костного мозга, детский возраст до 8 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Специальных исследований, касающихся безопасности применения Метилурацила суппозитории ректальные

у беременных и в период грудного вскармливания, не проводились. Препарат применяют при беременности и в период грудного вскармливания только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Ректально: 0,5-1 г 3-4 раза в сутки, детям 8-15 лет - по 500 мг в сутки.

Курс лечения от 7 дней до 4 месяцев в зависимости от характера заболевания.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, кратковременное легкое жжение.

Передозировка

Препарат для ректального применения, о случаях передозировки препаратом не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Информация о взаимодействии с другими препаратами для ректального применения отсутствует, совместное применение препарата с другими ректальными средствами не рекомендуется.

Особые указания

Нет сведений.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Нет оснований полагать, что применение препарата Метилурацил может оказывать влияние на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные, 500 мг.

По 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из двухслойной пленки ПВХ-ПЭ или ЭП-73С.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары или хром-эрзац.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на этикетке.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Указание специальных мер предосторожности при уничтожении неиспользованных лекарственных препаратов

Нет сведений.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10.

Тел./факс: (4872)41-04-73