

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Бисакодил

**Регистрационный номер:** ЛП-005357

**Торговое наименование:** Бисакодил

**Международное непатентованное наименование:** Бисакодил

**Лекарственная форма:** Суппозитории ректальные

**Состав на 1 суппозиторий:**

*Действующее вещество:* бисакодил – 10,0 мг

*Вспомогательные вещества:* жир твердый (витепсол (марки Н 15, W 35), суппосир (марки NA 15, NAS 50)) - до получения суппозитория массой 1,25 г.

**Описание:** Суппозитории от белого до белого со слегка желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы.

**Фармакотерапевтическая группа:** слабительное средство

**Код АТХ:** А06АВ02

**Фармакологическое действие**

Вызывает раздражение рецепторного аппарата кишки, оказывает непосредственное влияние на слизистую оболочку кишечника, усиливая его перистальтику и повышая секрецию слизи в толстом кишечнике.

Не всасывается в кишечнике. Является пролекарством, в щелочной среде происходит гидролиз с образованием метаболита, оказывающего раздражающее действие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Действие наступает в течение первого часа.

**Показания к применению**

Гипотонические и атонические запоры (в т. ч. запоры у пожилых; запоры после операций и родов). Регулирование стула (геморрой, проктит, трещины заднего прохода). Подготовка к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность, кишечная непроходимость, ущемленная грыжа, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, перитонит, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, метроррагия, цистит, спастические запоры, острый проктит, детский возраст до 8 лет.

**С осторожностью:** Печеночная и/или почечная недостаточность.

**Применение при беременности и лактации**

С осторожностью возможно применение в период беременности и лактации.

**Способ применения и дозы**

Препарат применяют ректально в следующих дозах: взрослым и детям старше 14 лет – 10-20 мг бисакодила (1-2 суппозитория), детям 8-14 лет – 10 мг бисакодила (1 суппозиторий).

**Побочное действие**

Кишечная колика, диарея (дегидратация), нарушение водно-электролитного обмена, мышечная слабость, судороги,

снижение артериального давления), боль в животе, метеоризм, аллергические реакции.

**Передозировка**

Симптомы: диарея, обезвоживание, нарушение водно-электролитного баланса, гипокалиемия, атония толстой кишки.  
Лечение: симптоматическое.

**Особые указания** Не применять в течение длительного времени.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Форма выпуска** Суппозитории ректальные, 10 мг.

По 1, 2, 3, 4 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из двухслойной пленки.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары.

По 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из двухслойной пленки.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары.

По 6 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из двухслойной пленки.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары.

По 7 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из двухслойной пленки.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары.

По 8 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из двухслойной пленки.

1, 2, 3, 4, 5, 6 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары.

По 9 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из двухслойной пленки.

1, 2, 3, 4, 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары.

По 10 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из двухслойной пленки.

1, 2, 3, 4 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности** 3 года. Не применять после даты истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска** Отпускают без рецепта.

**Производитель/Организация, принимающая претензии:** ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10 Тел./факс: +7 (4872) 41-04-73.