

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО

**Регистрационный номер:** ЛП-003828

**Торговое наименование:** Облепиховое масло.

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Облепихи масло.

**Лекарственная форма:** суппозитории ректальные.

**Состав на один суппозиторий:**

*Действующее вещество:*

Облепиховое масло концентрат с содержанием каротиноидов не менее 240 мг/% - 0,5 г.

*Вспомогательные вещества:*

*Основа для суппозитория:*

жир твердый (витепсол, суппосир) 1,425 г

глицерина моностеарат 0,075 г

- до получения суппозитория массой 2,0 г.

**Описание:** Суппозитории от оранжевого до темно-оранжевого цвета, торпедообразной формы, с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** Геморроя средство лечения растительного происхождения.

**Код АТХ:** C05AX

**Фармакологическое действие**

Облепиховое масло стимулирует репаративные процессы в коже и слизистых оболочках, ускоряет заживление поврежденных тканей, оказывает противовоспалительное действие. Обладает антиоксидантным и цитопротекторным действием (благодаря наличию жирорастворимых биоантиоксидантов уменьшает интенсивность свободнорадикальных процессов и защищает от повреждения клеточные и субклеточные мембраны).

**Показания к применению**

Геморрой, анальные трещины, эрозивно-язвенные поражения прямой кишки (в том числе, эрозивно-язвенный сфинктерит и проктит), катаральный и атрофический проктит, лучевое поражение слизистой оболочки нижних отделов толстой кишки.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, диарея.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза

для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

**Способ применения и дозы**

Ректально. После опорожнения кишечника суппозиторий вводят глубоко в задний проход. Взрослым и подросткам старше 14 лет назначают по 1 суппозиторию 2 раза в день. Продолжительность курса лечения составляет 10-15 дней. При необходимости, по согласованию с врачом, через 4-6 недель курс лечения повторяют.

**Побочное действие**

Редко возможны аллергические реакции, ощущение жжения в анальной области, диарея.

**Передозировка**

Случаи передозировки не описаны.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не описано.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Данные о влиянии препарата на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами) отсутствуют.

**Форма выпуска**

Суппозитории ректальные 500 мг.

По 4, 5, 6 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из двухслойной пленки или из пленки из полимерных материалов или пленки ПВХ/ПЭ белой комбинированной или из пленки поливинилхлоридной.

1, 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.

**Условия хранения**

В защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата.**

**Производитель/Организация, принимающая претензии:**

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73