

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Внимательно прочтайте эту инструкцию перед тем, как начать прием этого лекарства.

Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции.

Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.

Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.

Обратитесь к врачу, если Ваше состояние ухудшилось.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения.

Хлорофиллонг®

Регистрационный номер: ЛСР-003271/07 от 17.10.2007

Торговое название: Хлорофиллонг®

МНН или группировочное название: Эвкалипта прутовидного листьев настойка

Лекарственная форма: раствор для приема внутрь и местного применения спиртовой

Состав: Эвкалипта прутовидного листьев – 200 г, меди двуххлористой 2-водной (меди хлорида дигидрата) – 0,06 г, спирта этилового 95 % (этанола) до получения 1000 мл препарата.

Описание. Прозрачная жидкость от зеленого до темно-зеленого цвета с характерным запахом. Возможно помутнение жидкости и выпадение осадка в процессе хранения.

Фармакотерапевтическая группа: Противомикробное средство растительного происхождения.

Код ATX: D06BX

Фармакологические свойства: Препарат обладает широким спектром противомикробного действия, в том числе – по отношению к антибиотикоустойчивым штаммам золотистого стафилококка; стимулирует регенерацию поврежденных тканей.

Показания к применению:

Местно: в комплексном лечении ожогов и трофических язв, эрозии шейки матки. Внутрь и местно: для санации кишечника при стафилококконосительстве.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, **возраст до 18 лет.** При применении внутрь: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Способ применения и дозы:

Для местного применения: при лечении ожогов и трофических язв препарат разводят в соотношении 1:5 в 0,25 % растворе новокаина. Используют в виде пропитанных раствором марлевых повязок. Курс лечения - 2-3 недели.

При лечении эрозии шейки матки предварительно осушают тампоном все складки слизистой влагалища и влагалищной части шейки матки. Смазывают канал шейки матки и эрозии неразведенным препаратом. Курс лечения – 10 дней.

Для спринцевания влагалища используют раствор, получаемый разведением 15 мл (1 столовой ложки) препарата в 1 л воды. Курс лечения – 2 недели.

При стафилококковом поражении кишечника принимают внутрь по 5 мл препарата, разведенного в 30 мл воды, 3 раза в день за 40 мин перед едой ежедневно. Препарат применяют также местно ректально в клизме (по 20 мл препарата в 1 л воды – доза для одной клизмы) 1 раз в 2 дня. Курс лечения состоит из 10 процедур.

Перед применением препарат необходиимо взбалтывать.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочное действие:

Аллергические реакции: отечность губ, слизистых оболочек, кожные высыпания.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, *сообщите об этом врачу*.

Передозировка:

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При взаимодействии препарата с перекисью водорода выпадает осадок. Поэтому после обработки раны раствором перекиси водорода перед использованием препарата Хлорофилон[®] рану следует промыть стерильным 0,9 % раствором натрия хлорида.

Особые указания:

До лечения необходимо проверить индивидуальную чувствительность пациента к препаратуре. Для этого пациенту дают выпить 25 капель препарата, разведенных в 1 столовой ложке воды. При отсутствии через 6-8 ч аллергических реакций (отечности губ, слизистых оболочек, кожных высыпаний) можно назначить курсовое лечение препаратом; при наличии аллергических реакций препарат противопоказан.

Содержание абсолютного этилового спирта при приеме препарата внутрь составляет в максимальной разовой дозе – 5,19 г, в максимальной суточной дозе – 15,57 г.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

при применении препарата внутрь необходимо воздерживаться от управления транспортными средствами и занятиями другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, так как препарат содержит этиловый спирт.

Форма выпуска:

Раствор для приема внутрь и местного применения спиртовой. По 25, 50 и 100 мл во флаконы темного стекла. По 25, 50 и 100 мл во флаконы стеклянные из коричневого стекла для упаковки медицинских препаратов. По 25, 50 и 100 мл во флаконы полимерные. По 100 мл во флаконы темного стекла. Каждый флакон вместе с ложкой дозировочной или без или со стаканом мерным или без, или шприцем дозировочным или без, вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска:

Отпускают без рецепта.

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10.