

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА

Номер регистрационного удостоверения: ЛП-001889

Торговое наименование Эвкалипта настойка

Лекарственная форма настойка

Состав:

Для получения 1000 мл препарата необходимо:

Действующее вещество:

Эвкалипта прутовидного листья – 200 г

Вспомогательное вещество:

Этанол (этиловый спирт) 70 % - достаточное количество до получения 1000 мл препарата.

Описание

Прозрачная жидкость зеленовато-коричневого цвета, своеобразного запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептическое средство растительного происхождения

Фармакологическое действие

Оказывает местное противовоспалительное, антисептическое действие.

Показания к применению

В комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний глотки и верхних дыхательных путей (фарингит, ларингит, трахеит), полости рта (стоматит, гингивит).

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет. Для ингаляций – бронхиальная астма, бронхоспазм, коклюш.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Местно, ингаляционно.

Для полосканий у взрослых и детей старше 3 лет используют по 10-15 капель на стакан воды 3-4 раза в день; для паровых ингаляций – по 10-15 капель на стакан воды 1-2 раза в день.

Курс лечения 10 дней. При необходимости проводят повторные курсы с двухнедельными перерывами (или без них) после консультации с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При правильном применении препарата случаи передозировки не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами Не описано.

Особые указания

В период применения лекарственного препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Форма выпуска Настойка.

По 25, 40, 80 мл препарата во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полимерными и крышками полимерными навинчивающимися.

По 25, 40, 80 мл во флаконы из полиэтилентерефталата, укупоренные колпачками полимерными винтовыми.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

По 18 кг в бутыли стеклянные или канистры полимерные (для производства нестерильных лекарственных средств).

Срок годности

5 лет. Не применять после истечения срока годности.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73