

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РУК

Регистрационный номер: ЛП-001936

Торговое наименование

Жидкость для рук

Международное непатентованное или группировочное наименование

Аммиак+Глицерол+Этанол

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения [спиртовой]

Состав:

Активные вещества:

Аммиака раствор 10 % - 25 мл, глицерол - 25 г, этанол 95 % - 25 мл

Вспомогательное вещество:

Вода очищенная - до 100 мл

Описание

Прозрачная бесцветная жидкость с запахом аммиака.

Фармакотерапевтическая группа

Дерматопротекторное средство

Код АТХ: D08AX

Фармакологические свойства

Антисептическое, дерматопротекторное средство, действие которого обусловлено активными веществами, входящими в состав препарата. Смягчает кожу рук.

Показания к применению

Сухость кожи рук.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, нарушение целостности кожных покровов, воспалительные заболевания кожи (в том числе дерматит, экзема) и другие заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения препарата, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Не изучалось. При беременности и в период грудного вскармливания применяют только в том случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Наружно. Препарат наносят на чистую и высушенную кожу рук 2-3 раза в день. Лечение осуществляется по мере необходимости, до устранения симптомов. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо

проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Аллергические реакции (покраснение, высыпания на коже, зуд). Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Не изучалось.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не изучалось.

Особые указания

Препарат предназначен только для наружного использования. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки. При попадании препарата в глаза или на слизистые оболочки рекомендуется промыть их достаточным количеством воды.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения [спиртовой].

По 80, 100 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полимерными и крышками полимерными навинчиваемыми.

По 80, 100 мл во флаконы полимерные, укупоренные пробками-капельницами полимерными, или дозаторами полимерными, или наконечниками полимерными и крышками полимерными.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается укладка флаконов вместе с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку из картона.

Срок годности

2 года. Не использовать после истечения срока годности.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73