

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Фукорцин

Регистрационный номер: ЛП-001033

Торговое название: Фукорцин

Лекарственная форма: раствор для наружного применения [спиртовой].

Состав на 100 мл:

Действующие вещества: борная кислота – 0,8 г, фенол – 3,9 г, резорцинол (резорцин) – 7,8 г, краситель фуксин основной – 0,4 г.

Вспомогательные вещества: ацетон – 4,9 мл, этиanol (спирт этиловый) 95 % – 9,6 мл, вода очищенная – до 100 мл.

Описание: жидкость темно-красного цвета с характерным запахом фенола.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.

Код ATX: D08AD.

Фармакологические свойства: обладает антисептическим и противогрибковым действием.

Показания для применения: гнойничковые и грибковые заболевания кожи, поверхностные раны, эрозии, трещины, ссадины кожи.

Противопоказания для применения: повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы: наружно. Раствор наносят с помощью ватного тампона или помазка на пораженные участки кожи 2-4 раза в день. После подсыхания жидкости на обработанный участок можно наносить мази и пасты.

Побочное действие: кратковременное ощущение жжения и боли, которое проходит самостоятельно и не требует отмены препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: нет данных.

Особые указания. Не следует наносить препарат на большие участки кожи, т.к. фенол, входящий в состав раствора, проникает в кровь и может вызвать токсические явления (головокружение, слабость, расстройства дыхания). Препарат имеет своеобразный запах и красный цвет и может пачкать белье.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами и механизмами: нет данных.

Форма выпуска. Раствор для наружного применения [спиртовой].

По 10, 15, 25 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полимерными и крышками полимерными навинчиваляемыми.

По 10 мл во флаконы стеклянные с винтовой горловиной, укупоренные крышками полимерными навинчиваляемыми.

По 10 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные колпачками полимерными винтовыми, или крышками полимерными навинчиваляемыми с помазком.

По 10, 15, 25 мл во флаконы из полиэтилентерефталата, укупоренные колпачками полимерными винтовыми, или крышками полимерными навинчиваляемыми с помазком.

Флаконы вместе с инструкцией по применению помещают в пачки из картона.

Допускается упаковка флаконов вместе с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку из картона.

По 1000 мл в бутыли оранжевого стекла с навинчиваляемыми крышками (для стационаров).

Бутыли помещают в групповую упаковку из картона с равным количеством инструкций по применению.

Срок годности: 2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек. Безрецептно.

Предприятие-производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73