

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ЭЛЕУТЕРОКОККА ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ

Регистрационный номер: ЛП-001493

Торговое наименование

Элеутерококка экстракт жидкий

Лекарственная форма

Экстракт для приема внутрь [жидкий]

Состав

Для приготовления 1000 мл препарата необходимо:

Действующее вещество:

Элеутерококка колючего корневища и корни - 1000 г

Вспомогательное вещество:

Этанол (этиловый спирт) 40% - до получения 1 л экстракта.

Описание

Жидкость темно-коричневого цвета, в тонком слое прозрачная, запах своеобразный, специфический. При хранении возможно образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Общетонизирующее средство растительного происхождения.

Код ATX: A13A.

Фармакологические свойства

Оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систему, тонизирующее и общеукрепляющее действие на организм, повышает общую неспецифическую сопротивляемость организма, способствует улучшению аппетита, повышению физической и умственной работоспособности.

Показания к применению

Умственное и физическое переутомление, астенические состояния различной этиологии, артериальная гипотензия (пониженное артериальное давление), в период выздоровления после инфекционных заболеваний и послеоперационный период.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление), нарушение сердечного ритма, инфаркт миокарда, cerebrovascularная патология, повышенная возбудимость, эпилепсия, судорожные состояния, бессонница, острые инфекционные заболевания, хронические заболевания печени, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

С осторожностью: алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, детский возраст старше 12 лет.

Способ применения и дозы

Препарат применяют внутрь до еды в первой половине дня. Взрослым назначают по 20-30 капель 2-3 раза в день. Детям старше

12 лет – в дозе из расчета по 1 капле на 1 год жизни. Курс лечения 25-30 дней. При необходимости проводят повторные курсы с двухнедельными перерывами (или без них) после консультации с врачом.

Перед употреблением взбалтывать.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, бессонница, гипогликемия, головная боль, тахикардия. При появлении побочных эффектов, неописанных в данной инструкции следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка.

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Усиливает действие стимуляторов центральной нервной системы, является антагонистом лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему (в том числе нейролептиков, барбитуратов, анксиолитиков, противоэpileптических лекарственных средств). При одновременном применении с дигоксином возможно повышение концентрации в плазме крови последнего; с гипогликемическими лекарственными средствами (в т.ч. инсулин) и антикоагулянтами возможно усиление эффекта.

Особые указания

Препарат не следует принимать во второй половине дня во избежание нарушений сна.

Приявлении гипогликемии рекомендуется уменьшить дозу препарата, принимать его после еды или отменить препарат.

Максимальная разовая доза препарата содержит 0,43 г абсолютного этилового спирта, максимальная суточная доза препарата – 1,4 г абсолютного этилового спирта.

В период приема препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление транспортом, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Экстракт для приема внутрь [жидкий].

По 25, 50 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми пластмассовыми.

Каждый флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается упаковка флаконов с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73