

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ИНСТРУКЦИЯ**

**по применению лекарственного препарата  
для медицинского применения**

**ВИНИЛИН**

**(Шостаковского бальзам)**

**Номер регистрационного удостоверения:** ЛП-002178

**Торговое наименование:** Винилин (Шостаковского бальзам)

**Лекарственная форма:** бальзам

**Состав.**

Поливинокс (винилин) – 50 г или 100 г

**Описание:** густая, вязкая жидкость светло-желтого цвета, специфического запаха. На воздухе не густеет и не высыхает.

**Фармакотерапевтическая группа:** антисептическое средство

**Код АТХ:** [D08AX]

**Фармакологическое действие**

Обладает противомикробным действием, способствует очищению ран, регенерации тканей и эпителизации. При приеме внутрь действует как обволакивающее, противовоспалительное и бактериостатическое средство.

**Показания к применению**

Наружно: фурункулы, карбункулы, трофические язвы, гнойные раны, мастит, раны мягких тканей, ожоги и обморожения.

Внутри: в комплексном лечении эрозивно-язвенных заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки, обострение хронических гастритов с повышенной секреторной функцией желудка.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность.

При приеме препарата внутрь: заболевания печени, желчного пузыря и почек, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

**Способ применения и дозы**

Наружно: для смачивания салфеток и непосредственного нанесения на раневую поверхность в достаточном

количестве.

Внутри: 1 раз в день через 5-6 часов после последнего приема пищи (рекомендуется легкий ужин в 18 часов и прием препарата в 23-24 часа).

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки: 1 чайная ложка в первый день, в последующие дни – по 1 десертной ложке, курс – 16-20 дней.

При гастритах с повышенной секреторной функцией: 1 чайная ложка в первый день, далее – по 1 десертной ложке через день, курс – 10-12 дней.

#### **Побочное действие**

Аллергические реакции.

#### **Передозировка**

Данные о случаях передозировки отсутствуют.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Не изучалось.

#### **Форма выпуска.** Бальзам.

По 50 г, 100 г препарата во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полимерными и крышками полимерными навинчиваемыми.

По 50 г, 100 г во флаконы из полиэтилентерефталата, укупоренные колпачками полимерными винтовыми.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается укладка флаконов в групповую упаковку с равным количеством инструкций по применению.

#### **Срок годности**

5 лет. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

#### **Условия хранения**

В хорошо укупоренной таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Условия отпуска из аптек** Без рецепта.

#### **Производитель/Организация, принимающая претензии:**

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73