

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ИХТИОЛ

Регистрационный номер: ЛП-003531

Торговое наименование: Ихтиол

Группировочное наименование: Ихтаммол.

Лекарственная форма: суппозитории ректальные.

Состав на один суппозиторий: *Действующее вещество:* Ихтиол (ихтаммол) - 0,2 г. *Вспомогательные вещества:* Вода очищенная - 0,038 г, Эмульгатор «Твердый – 2» (Т-2) - 0,05 г. *Основа для суппозиториев* Жир твердый (Витепсол (марки Н 15, W 35), Суппосир (марки NA 15, NAS 50)) - до получения суппозитория массой 1,23 г.

Описание: Суппозитории темно-коричневого цвета с характерным запахом, торпедообразной формы, с максимальным диаметром 1,2 см

Фармакотерапевтическая группа: Противовоспалительное средство для местного применения

Код АТХ: D10BX01

Фармакологические свойства

Противовоспалительное средство, оказывает местнообезболивающее, антисептическое действие. Противовоспалительное действие связано с ингибированием высвобождения медиаторов воспаления. При ректальном введении препарат оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку прямой кишки, вследствие чего рефлекторно усиливается кровообращение в органах малого таза, улучшается обмен веществ, что способствует устранению воспаления в предстательной железе у мужчин, яичниках, маточных трубах, матке у женщин.

Показания к применению

Сальпингоофорит, эндометрит, простатит в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

При беременности и в период лактации препарат применяют с осторожностью, необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Ректально: по 1 суппозиторию 1-2 раза в день после очистительной клизмы или самопроизвольного очищения кишечника. Длительность курса лечения определяется лечащим врачом.

Побочное действие.

Аллергические реакции, ощущение жжения в области заднего прохода.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Несовместим в растворах с йодистыми солями, алкалоидами, солями тяжелых металлов.

Сведения о возможном влиянии лекарственного препарата для медицинского применения на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не изучалось.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные 200 мг.

По 4, 5, 6 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из двухслойной пленки или из пленки из полимерных материалов или пленки ПВХ/ПЭ белой комбинированной или из пленки поливинилхлоридной.

1, 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата.**Производитель/Организация, принимающая претензии:**

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73