

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
МЕТИЛУРАЦИЛ**

Номер регистрационного удостоверения: ЛП-002576

Торговое наименование: Метилурацил

Международное непатентованное или химическое (группировочное) наименование: Диоксометилтетрагидропирамидин

Лекарственная форма: мазь для местного и наружного применения

Состав на 100 г.

Действующее вещество: метилурацил – 10,0 г

Вспомогательные вещества: вазелин – 45,0 г; ланолин безводный – 31,5 г; вода очищенная – 13,5 г

Описание: мазь от светло-желтого до желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: репарации тканей стимулятор

Код ATX: [D11AX]

Фармакологическое действие

Обладает анаболической активностью. Нормализуя нуклеиновый обмен, ускоряет процессы клеточной регенерации в ранах, ускоряет рост и грануляционное созревание ткани и эпителизацию. При наружном применении обладает фотопротекторными свойствами.

Показания к применению

Вялозаживающие раны, ожоги, фотодерматит.

Профилактика реакций кожи при облучении новообразований с невысокой радиочувствительностью, уменьшения симптомов лучевого дерматита и поздних сращений стенок (окклюзий) влагалища – в случае лучевой терапии новообразований гениталий.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, избыточность грануляций.

С осторожностью

Беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. При необходимости назначения препарата в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

Способ применения и дозы

Наружно. Местно.

Мазь ежедневно наносят на пораженные участки тонким слоем в количестве 5-10 г ежедневно в течение 15-30 дней.

Перед нанесением рану следует обработать антисептиком и удалить остатки некротических тканей.

В случае лучевой терапии новообразований гениталий для профилактики и лечения радиоэпителиита мазь используют в рыхлых тамponsах. Курс лечения индивидуален.

Побочное действие

Аллергические реакции, кратковременное жжение в месте нанесения препарата.

Передозировка

Случаи передозировки при местном и наружном применении не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Препарат совместим с наружными аппликациями антибактериальных и антисептических средств.

Влияние на способность управлять автотранспортом и механизмами

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (работа диспетчера, управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Мазь для местного и наружного применения 10 %.

По 25 г, 30 г в банки из полистиlena с крышками полимерными.

По 25 г, 30 г в банки из полиэтилентерефталата с крышками полимерными.

По 25 г в банки оранжевого стекла с треугольным венчиком с крышками полимерными натягиваемыми.

По 25 г, 30 г в тубы алюминиевые.

Каждую банку или тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Для стационаров: 30 или 60 банок вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в ящики из гофрокартона; 40 или 99 туб вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в ящики из гофрокартона.

Условия хранения

При температуре не выше 20 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года 6 месяцев.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73