

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ПОЛЫНИ НАСТОЙКА

**Регистрационный номер:** ЛП-001210

**Торговое наименование:** Полыни настойка

**Группировочное наименование:** Полыни горькой травы настойка

**Лекарственная форма:** настойка

**Состав на 1000 мл:**

*Активный компонент:*

Полыни горькой трава – 200 г

*Вспомогательное вещество:*

Этанол (этиловый спирт) 70 % – до 1000 мл

**Описание:** прозрачная жидкость коричневато-зеленого цвета с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** стимулятор аппетита растительного происхождения.

**Код ATX:** [A15]

**Фармакологические свойства**

Основными действующими веществами являются арсумин (сумма лактонов) и абсинтин (индивидуальный лактон). Раздражая вкусовые рецепторы слизистых оболочек рта и языка, полыни настойка рефлекторным путем вызывает усиление секреции желудочного сока, повышение аппетита, улучшение пищеварения. Оказывает противовоспалительное, желчегонное и противомикробное действие.

**Показания к применению**

Анорексия, гипо- и анацидный гастрит, хронический холецистит, дискинезия желчевыводящих путей по гипомоторному типу.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность, повышенная желудочная секреция, гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагит, острый холецистит, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

**С осторожностью**

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, детский возраст старше 12 лет.

**Способ применения и дозы**

Внутрь по 15–20 капель, разведенных в ¼ стакана воды, 2–3 раза в день за 20–30 минут до еды. Курс лечения 20–25 дней.

**Побочное действие** Возможны аллергические реакции. При длительном употреблении – изжога, гастралгия, диарея, тошнота, рвота.

**Передозировка**

При длительном применении в дозах, превышающих рекомендуемые, возможны: трепор, головная боль, головокружение, судороги. Лечение: симптоматическое.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами** Не описано.

**Особые указания.** В максимальной суточной дозе препарат содержит 0,7 г абсолютного спирта, в максимальной разовой дозе – 0,23 г.

В период применения препарата следует соблюдать осторожность при управлении автотранспортом и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Форма выпуска** Настойка.

По 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 90, 100 мл во флаконы-капельницы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полизиленовыми или пробками-капельницами полизиленовыми и навинчиваемыми пластмассовыми крышками.

По 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 90 и 100 мл во флаконы темного стекла, укупоренные пробками полизиленовыми или пробками-капельницами или пробками и навинчиваемыми пластмассовыми крышками.

Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается упаковка флаконов, флаконов-капельниц без пачки от 9 до 200 штук с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку - ящик из гофрированного картона (для стационаров).

По 9, 18 кг в бутыли стеклянные, укупоренные пробками притертymi или крышками навинчиваемыми с прокладками (для стационаров).

Каждую бутыль по 9; 18 кг с инструкцией по применению помещают в ящик из гофрированного картона (для стационаров).

**Условия хранения.**

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

5 лет. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска из аптек** Без рецепта.

**Производитель/Организация, принимающая претензии:**

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73