

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
Перца стручкового настойка

**Номер регистрационного удостоверения:** ЛП-002163

**Торговое наименование:** Перец стручкового настойка

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** перец стручкового плодов настойка

**Лекарственная форма:** настойка

**Состав.**

Для получения 1000 мл настойки необходимо:

*Действующее вещество:*

Перца стручкового плоды - 100 г

*Вспомогательное вещество:*

Этанол (этиловый спирт) 90 % - достаточное количество до получения 1000 мл настойки.

**Описание:** прозрачная жидкость красновато-жёлтого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** местнораздражающее средство растительного происхождения.

**Код ATX:** [M02AB]

**Фармакологическое действие**

Фармакологические свойства препарата обусловлены содержанием алкалоида капсацина. Препарат обладает местным раздражающим, отвлекающим и разогревающим действием, вызывая усиление местного кровотока в коже, воздействуя на болезненные процессы, локализованные также и в глубине тканей.

**Показания к применению**

В качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при невралгиях, радикулитах, миозитах, люмбаго, люмбошиалигии.

**Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата; дерматологические заболевания в месте нанесения препарата, нарушение целостности кожных покровов; детский возраст до 12 лет.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Необходимо проконсультироваться с врачом.

**Способ применения и дозы**

Наружно. Небольшое количество настойки втирают в соответствующий участок кожи 1-2 раза в сутки.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения

и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

#### **Побочное действие**

Аллергические реакции, сильное жжение в месте нанесения препарата.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

#### **Передозировка**

Случаи передозировки препарата не описаны.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Не описано.

#### **Особые указания**

Не допускать попадания препарата в глаза. Препарат не следует наносить на слизистые оболочки, открытые раны и повреждённые или воспалённые участки кожи. После применения настойки необходимо тщательно вымыть руки тёплой водой с мылом. При попадании препарата в рот или нос необходимо тщательно промыть их водой.

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

#### **Форма выпуска**

Настойка.

По 25 мл препарата во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полимерными и крышками полимерными навинчиваемыми.

По 25 мл препарата во флаконы-капельницы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками-капельницами полимерными и крышками полимерными навинчиваемыми.

По 25 мл во флаконы из полиэтилентерефталата, укупоренные колпачками полимерными винтовыми.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

По 18 кг в бутыли стеклянные или канистры полиэтиленовые (для производства нестерильных лекарственных средств).

#### **Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

4 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

#### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

#### **Производитель/Организация, принимающая претензии:**

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73