

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата  
Рыбий жир очищенный для внутреннего применения

**Номер регистрационного удостоверения.** ЛП-002458

**Торговое наименование.** Рыбий жир очищенный для внутреннего применения.

**Лекарственная форма.** Масло для приема внутрь.

**Состав:**

*Действующее вещество:*

Рыбий жир из печени тресковых рыб

**Описание.** Прозрачная маслянистая жидкость от светло-желтого до желтого цвета со специфическим непрогоркlyм запахом.

**Фармакотерапевтическая группа**

Витамин-кальциево-фосфорного обмена регулятор.

**Код ATX:** A11CB

**Фармакологическое действие**

Действие препарата обусловлено содержанием витаминов А и Д и ненасыщенных жирных кислот. Витамин А (ретинол) участвует в обменных процессах в слизистых оболочках и коже, в формировании зрительных пигментов, необходимых для нормального сумеречного и цветового зрения; обеспечивает целостность эпителиальных тканей, регулирует рост костей. Витамин D (колекальциферол) регулирует обмен кальция ( $\text{Ca}^{2+}$ ) и фосфатов, процесс построения структуры костей; повышает абсорбцию  $\text{Ca}^{2+}$  в кишечнике; ненасыщенные жирные кислоты принимают участие в синтезе арахидоновой кислоты, лейкотриенов и простагландинов; способствуют снижению холестерина в сыворотке крови, понижают агрегацию тромбоцитов, улучшают реологические свойства крови.

**Показания к применению**

Гипо- и авитаминоз А и D (частые респираторные заболевания, реконвалесценция, нарушения роста костей, снижение зрения, нарушение структуры кожи, волос, ногтей, зубов, рахит); профилактика остеопатий разного генеза.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность, гипокоагуляция, гемофилия, хронический холецистит и панкреатит (и периоды их обострения), активная форма туберкулеза легких, тиреотоксикоз, хроническая почечная недостаточность, гипервитаминоз витаминов А и D, гиперкальциемия, гиперкальциурия, саркоидоз, кальциевый нефроуролитиаз, длительная иммобилизация, детский возраст до 3 месяцев.

**С осторожностью**

Острый и хронический нефрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гипотиреоз, период грудного вскармливания, органические поражения сердца, острые и хронические заболевания печени и почек, пожилой возраст.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение при беременности не рекомендуется. Применение в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом!

**Способ применения и дозы**

Внутрь. Препарат рекомендуется принимать во время еды.

**Режим дозирования:** детям с 3-х месяцев –  $\frac{1}{2}$  чайной ложки (2,5 мл) в день; детям в возрасте 1 года – 1 чайную ложку (5 мл) в день; детям с 2 лет – по 1-2 чайные ложки в день; детям с 3 до 6 лет – по 1 десертной ложке (10 мл) в день; детям с 7 лет и взрослым –

по 1 столовой ложке (15 мл) в день. Курс лечения назначает лечащий врач в зависимости от показаний к применению.

1 г препарата содержит: от 350 до 1000 МЕ витамина А, от 50 до 100 МЕ витамина D.

1 мл препарата содержит: от 320 до 927 МЕ витамина А, от 45,85 до 92,7 МЕ витамина D.

5 мл препарата содержит: от 1600 до 4635 МЕ витамина А, от 229,25 до 463,5 МЕ витамина D.

10 мл препарата содержит: от 3200 до 9270 МЕ витамина А, от 458,5 до 927 МЕ витамина D.

15 мл препарата содержит: от 4800 до 13905 МЕ витамина А, от 687,75 до 1390,5 витамина D.

#### **Побочные действия**

Аллергические реакции, диарея, снижение свертываемости крови, запах рыбы изо рта.

#### **Передозировка**

При продолжительном применении препарата может возникнуть сонливость, вялость, головная боль, снижение аппетита, тошнота, рвота, диарея, боль в костях нижних конечностей.

Лечение: симптоматическое, отмена препарата.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

При одновременном применении препарата с другими лекарственными средствами, содержащими витамины А и D, существует возможность развития витаминной интоксикации. Необходимо соблюдать особую осторожность при одновременном приеме препарата и лекарственных средств, влияющих на свертываемость крови.

#### **Особые указания**

Перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом!

Рекомендуется прекратить прием препарата не менее чем за 4 дня до проведения оперативного лечения или другого хирургического вмешательства.

#### **Влияние на способность управлять автотранспортом и механизмами**

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

#### **Форма выпуска**

Масло для приема внутрь.

По 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 90 и 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками полистиленовыми и навинчиваемыми пластмассовыми крышками.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

#### **Срок годности**

2 года. Не применять по истечении срока годности.

#### **Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 10 °C.

Допускается замораживание. Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

#### **Производитель/Организация, принимающая претензии:**

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10 Тел./факс: (4872) 41-04-73