

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
АНУЗОПРОКТ

Регистрационный номер ЛП-005396

Торговое наименование

Висмута субнитрат + Йод + Цинка оксид

Международное непатентованное наименование

Висмута субнитрат + Йод + Цинка оксид

Лекарственная форма

Суппозитории ректальные

Состав на один суппозиторий:

Действующие вещества: висмута субнитрат (висмута нитрат основной) – 0,075 г, цинка оксид – 0,2 г, йод – 0,005 г.

Вспомогательные вещества: танин – 0,05 г, резорцинол – 0,005 г, метилтиониния хлорид – 0,003 г, жир твердый тип А – 2,001 г, эмульгатор Т-2 – 0,041 г.

Описание

Суппозитории серовато-зеленого или синевато-зеленого цвета, торпедообразной формы. Допускается появление на поверхности суппозитория белого налета.

Фармакотерапевтическая группа

Геморроя средство лечения

Код АТХ: С05АХ02.

Фармакологические свойства Противогеморроидальное средство.

Обладает антисептическим и вяжущим действием.

Показания к применению Геморрой, трещины заднего прохода.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата возможно только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

В случае необходимости применения препарата во время беременности или в период грудного вскармливания следует предварительно проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы Ректально.

По 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки. Обычно длительность курса

лечения составляет 7-10 дней.

Если через 7-10 дней лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка Не описано.

При передозировке препарата необходимо немедленно обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Нет данных.

Особые указания

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. Не превышайте максимальные сроки лечения и рекомендованные дозы при самостоятельном применении препарата.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами Нет данных.

Форма выпуска Суппозитории ректальные.

По 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из двухслойной пленки ПВХ/ПЭ или из пленки из полимерных материалов ПВХ/ПЭ или из пленки ПВХ/ПЭ белой комбинированной или из пленки поливинилхлоридной.

По 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку картонную.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тюльская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872)41-04-73