

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
КЛЕЙ БФ-6

Регистрационный номер. ЛП-001348

Торговое наименование. Клей БФ-6

Лекарственная форма. Раствор для наружного применения
[спиртовой]

Состав на 100 г.

Активное вещество:

Фенолформальдегидная смола (лак бакелитовый на сухое вещество)
в растворе со спиртом этиловым 95 % - 1,65 г

Вспомогательные вещества:

Поливинилбутирал (поливинилбутираль) - 9,7 г

Дибутилфталат - 3,5 г

Касторовое масло - 1,75 г

Канифоль - 0,85 г

Спирт этиловый 95 % - 82,55 г

Описание: прозрачная или слегка мутная жидкость от светло-желтого до красноватого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.

Код АТХ: D08AE

Фармакологические свойства

Клей БФ-6 обладает ранозаживляющим и антисептическим действием. Используется как изолирующее средство, способствует заживлению мелких кожных ран вследствие образования на их поверхности изолирующей пленки. Пленка эластична и устойчива к механическим и химическим воздействиям.

Показания для применения Клей БФ-6 применяется для обработки микроtraвм – ссадин, царапин, порезов.

Противопоказания для применения Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до одного года.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания: возможно применение лекарственного препарата.

Способ применения и дозы

Наружно. Перед нанесением препарата участок кожи тщательно

очищают от загрязнений. Ватным или марлевым тампоном останавливают кровотечение и подсушивают место, подлежащее покрытию клеем. Препарат наносят тонким, равномерным слоем непосредственно на поврежденную поверхность, захватывая окружающие здоровые ткани. В случае нарушения целостности пленки поверх нее наносят новую пленку. Пленка образуется в течение 2-5 минут после нанесения препарата и прочно удерживается на коже.

Передозировка

При указанном способе применения практически невозможна.

Побочные действия

Жжение в месте нанесения, аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Нет данных.

Особые указания Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска. Раствор для наружного применения [спиртовой]. По 5, 10, 15, 25, 40 г во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками пластмассовыми навинчиваемыми.

По 5, 10, 15, 25, 40 г во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками полимерными с уплотнительными элементами.

По 5, 10, 15, 25, 40 г в тубы алюминиевые с колпачками из полиэтилена.

По 5, 10, 30 г во флаконы-капельницы полимерные.

Каждый флакон, флакон-капельницу или тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С, вдали от источников нагрева и открытого огня. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 4 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73