

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Камфорное масло

Регистрационный номер: ЛП-000859

Торговое название.

Камфорное масло

МНН или группировочное название. Камфора

Лекарственная форма.

Раствор для наружного применения [масляный]

Состав на 1 л:

Действующее вещество:

Камфора рацемическая - 100 г

Вспомогательное вещество:

Подсолнечное масло - до 1 л

Описание. Прозрачная маслянистая жидкость желтого цвета с запахом камфоры.

Фармакотерапевтическая группа.

Местнораздражающее средство природного происхождения.

Код АТХ. M02AX10

Фармакологическое действие.

Препарат оказывает антисептическое, местнораздражающее, местное анальгезирующее и противовоспалительное действие.

Возбуждая чувствительные нервные окончания кожи, расширяет кровеносные сосуды и улучшает трофику органов и тканей.

Фармакокинетика.

При нанесении на поверхность кожи частично всасывается, подвергается окислению. Продукты окисления соединяются с глюкуроновой кислотой и выводятся почками. Часть камфоры выделяется в неизменном виде легкими и с желчью.

Показания для применения.

Артралгия, миалгия, ишиас, миозит, профилактика образования пролежней.

Противопоказания для применения.

Гиперчувствительность, нарушение целостности кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т. ч. дерматит, экзема), беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы.

Наружно. Миалгия, миозит, артралгия, ишиас: небольшое количество масла наносят на область болевых ощущений и легкими движениями растирают. Применяют 2-3 раза в день в течение 7-10 дней. Профилактика образования пролежней: обработка кожных покровов 2-3 раза в день.

Побочные действия.

Аллергические кожные реакции (крапивница), раздражение кожи, головная боль, головокружение.

Передозировка.

Симптомы: возбуждение, тахикардия, судороги.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Нет данных.

Особые указания.

Следует избегать попадания препарата на открытые раны, в глаза и слизистые оболочки.

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций из-за возможного возникновения побочного эффекта - головокружения.

Форма выпуска.

Раствор для наружного применения [масляный] 10%.

По 30, 50 или 100 мл во флаконы оранжевого стекла, закупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается упаковка флаконов без пачки вместе с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек.

Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, 10

Тел/факс: (4872) 41-04-73